

DËSHMUESI

TERVIGO®
020 SC

Novator

Formulimi i tij novator bën që Tervigo® 020 SC të ndryshoj nga formulimet ekzistuese pasi:

- ✓ Nuk shkakton stres në dozat e rekomanduara
- ✓ Nuk shkakton toksicitet në dozat e rekomanduara
- ✓ Për shkak të mbrojtjes së sistemit rrënjor nga nematodat, ka efekt pozitiv në prodhimtarinë




30-60%
rritje prodhimi
pas trajtimit me
TERVIGO®

TERVIGO® 020 SC vendoset dhe vepron rreth rrënjëve duke i mbrojtur ato nga prekjet e nematodëve

Elastik

- ✓ 0 ditë trajtimi i fundit para vjeljes
- ✓ Veprim në një diapazon të gjerë temperaturash
- ✓ Veprim në një interval të gjerë të PH të tokës

Rritja e prodhimit



Mesatarja e 19 eksperimenteve në kulturat bostanore (pjepër, shalqi, kastravec, kungull)

Burimi: Eksperimente nga Syngenta në Spanjë, Itali e Greqi

PËRDORIMI						
Kulturat bujqësore	Dëmtuesit	Doza		Mënyra dhe koha e trajtimit	Numri maksimal i trajtimeve/sezon	PHI
		ml preparat/dynym	l tretur në litra ujë/dynym			
Spec	Meloidogyne spp	500	1000 - 2000	Përdoret tek rrënjët nëpërmjet sistemit të ujitjes. Filloni trajtimet 1-5 ditë pas mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm dhe i vazhdoni ato deri në pjekjen e plotë të frutave.	4 trajtime me interval 10-14 ditë	0 ditë
Patlixhan						
Kastravec						
Kungull						
Pjepër						
Shalqi						
Fasule e njomë	Meloidogyne spp	500	1000 - 2000	Përdoret tek rrënjët nëpërmjet sistemit të ujitjes. Filloni trajtimet 1-5 ditë pas mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm dhe i vazhdoni ato deri në pjekjen e plotë të frutave.	6 trajtime me interval 10-14 ditë	0 ditë
Domate						

syngenta.

SYNGENTA Crop Protection AG
Basel, Switzerland

www.syngenta.com



KUJDES

- I dëmshëm nëse gëlltiet dhe në rast thithjeje.
- Mund të shkaktoj dëmtime në sistemin nervor pas ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.
- Shumë toksik për jetën ujore, me efekte afatgjata.

Kujdes! Preparatet për mbrojtjen e bimëve të përdorën në mënyrë të sigurtë. Para përdorimit lexoni gjithmonë etiketën dhe të dhënat për preparatin.

Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe për mjedisin, ndiqni me kujdes udhëzimet e përdorimit.

I projektuar që
të jetë superior!

Tervigo® 020 SC

syngenta.

Tervigo® 020 SC

syngenta.

Tervigo® 020 SC

Nematocidi i ri nga Syngenta, që me sintezën e tij novatore, siguron mbrojtje të shkëlqyer nga nematodat në një numër të madh kulturash bujqësore në serra, duke dhënë fleksibilitet të lartë lidhur me kohën e përdorimit dhe kohëzgjatje të madhe veprimi.

PËRMBAN: Abamectin 2 %, Lëndë ndihmëse 98 %


I efektshëm

- ✓ Tervigo® 020 SC është projektuar që të jetë superior në kontrollin e nematodave në një gamë të gjerë kulturash bujqësore në sera
- ✓ Sinteza e veçantë e Tervigo® 020 SC ndalon inaktivizimin e preparatit në tokë




Përdorim në kulturën e kastravecit me 2 trajtime në interval 10 ditor.

Krahasimi i efekshmërisë së Tervigo® 020 SC me dëshmuemin kimik



Burimi: Eksperimente nga Syngenta në Spanjë, Itali e Greqi, në domate të kultivuar në serrë



PSE Tervigo® ?

- ✓ Karencë zero – vjelje në të njëjtën ditë (PHI)
- ✓ Efektshmëri të lartë ndaj *Meloidogyne spp*
- ✓ Regjistruar për tu përdorur në kulturat kryesore të perimeve që mbillen në serra
- ✓ Veprim në një interval të gjerë të PH të tokës
- ✓ Nuk shkakton fitotoksicitet në kulturat dhe në dozat e rekomanduara



MËNYRA E VEPRIMIT

- ✓ Vepron nëpërmjet kontaktit dhe aparatit tretës
- ✓ Tervigo® 020 SC ndalon transmetimin e impulseve nervore tek larvat e stadi të dytë
- ✓ Përveç kësaj, sinteza e tij e veçantë pengon inaktivizimin e tij në tokë
- ✓ Efektshmëria e tij ruhet edhe në tokat ranore e në ato të pasura me lëndë organike



MËNYRA E APLIKIMIT

- ✓ Është e rëndësishme që toka para aplikimit të ketë marrë lagështi të mjaftueshme
- ✓ Të sigurohet shpërndarja uniforme e preparatit në zonën e rizosferës
- ✓ Në tokat shumë ranore rekomandohet përdorimi i tubacionit të dyfishtë, për një shpërndarje sa më uniforme

- Kryeni trajtimin e parë menjëherë pas mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm (1-5 ditë)
- Përsëritni trajtimet çdo 10-14 ditë.

Numri maksimal i trajtimeve
Spec, Patlixhan, Kastravec, Kungull, Pjepër, Shalqi, Fasule e njomë: 4
Domate: 6

Programi i propozuar

