

MASAT PARAMBROJTESE:

- **P102.** Mbjajeni ne vende te sigurta dhe te paaritshme nga femijet.
- Ruajeni larg ushqimeve dhe pijeve per njerezit si dhe ushqimeve per blegtorine.
- Evitoni kontaktet me syte dhe lekuren.
- **P270.** Gjate perdorimit te tij mos hani e mos pini uje dhe duhan.
- **P280.** Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Shmangni rrjedhjet ose pikimet e mjeteve sperkatese.
- Ne perfundim te punes lani paisjet mbrojtese, mjetet sperkatese.
- **P501.** Mblidhni ambalazhet ne kontejnere dhe beni shkaterrimin e tyre sipas rregullave ne fuqi.
- **EUH401.** Per te shmangur risqet ndaj shendetit njerezor dhe mjedisit, zbatoni udhezimet e perdorimit

FRAZAT E RREZIKUT DHE KESHILLA PER MJEKUN:

- **H318.** Shkakton demtime te rrenda te syrit.
- **P305+P351+P338.** Ne qoftese produkti ju bie ne sy, lajini menjehere me uje te bollshem per disa minuta. Nese keni lente i hiqni ato dhe vazhdoni shperlarjen
- Mund te shkaktoje reaksion alergjik si pasoje e permbajtjes se kripës se dimetilamin (2,4- diklorofenoksi) acid acetik (2,4-D DMA).
- **H302.** I demshemm nese gelltitet. Toksicitet akut. Ne rast helmimi nepermjet gojes, kerkoni menjehere ndihmen e mjekut. Si ndihme e pare mund te jete dhenia e te helmuarit 2-3 luge karbon aktiv me uje te ngrohte dhe me pas provokimi i vjelljes. Mos perdorni yndyrna, qumesht ose alkool.
- Ne rast helmimi, i aksidentuari dergohet ne qendren shendetesore me te afert, duke i treguar mjekut etiketen.
- Nuk njihet antidot specifik. Trajtimi simbas simptomave.

Data e prodhimit: Stampuar në shishe
Afati i ruajtjes: 3 vjet

AMINOPIELIK 600 SL

ADAMA

Lenda vepruese: 600 gr/lit 2.4-D –
(2,4-dichlorophenoxy)

Formulimi: Koncetrati i tretshem (SL)

Nr. i regjistrimit: 485 Dt. 02.10.2012



PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE

HERBICID SISTEMIK, PER LUFTIMIN E BARERAVE TE KEQIA GJETHEGJERA NE GRURE, ELB, MISER, DHE KULLOTA



Distributor:
MELDI Sh.p.k.
Tiranë - Shqipëri



Aplikant: **ADAMA Agriculture BV**
Prodhuesi: **ADAMA Manufacturing Poland SA**

Perdorimi:

AMINOPIELIK 600 SL kontrollon keto barera te keqia gjethegjera: Sinapin (*Sinapis arvensis*), rrepen e eger (*Raphanus raphanistrum*), dredhjen e arave (*Convolvulus arvensis*), grashinen (*Vicia spp.*), trasten e bariut (*Capsella bursa pastoris*), lulkuqen (*Papaver rhoeas*), rrodhen (*Xanthium spinosum*), gjembin e arave (*Cirsium arvense*), rogozin (*Typha spp.*), qiperin (*Cyperus spp.*), etj.

Koha me e mire per sperkatje eshte:

- ne grure, elb dhe tershere (nuk keshillohet perdorimin ne elbin per birre), nga fillimi i vellazerimit deri ne fund te ngritjes;
- ne miser, kur bimet kane arritur 10 cm lartesi; (evitoni pedorimin ne llojet sheqerore)
- ne kullota, kur bimet jane ne rritje intensive dhe kane arritur zhvillim te plote.

Perdoret me 1-1.25 lit/ha, te tretur ne 300-400 lit uje.

Verejtje per perdorimin:

Sperkatja rekomandohet te kryhet kur temperaturat e ajrit te jene midis 8 dhe 30° C.

Eshte me pak i efektshem ndaj kamomilit dhe galiumit.

Mos sperkatni ne dite me ere, kur ne afersi ndodhen kultura shume te ndjeshme ndaj ketij preparati si: panxhari, luledielli, pambuku, duhani, domatja dhe hardhia.

Mos sperkatni kur kultura ka kaluar strese te shkaktuara nga ngricat, thatesirat apo demtimet mekanike (p.sh. pas lesimit, etj.).

Fitotoksiciteti:

Nuke eshte fitotoksik kur perdoret ne kulturat, afatet dhe dozat sipas rekomandimeve ne kete etikete.

Ndikimi ne ekosistem:

H411. Toksike per jeten ujore me efekte te gjata.

Mos ndotni basenet, pellgjet dhe rruget e ujit me produktin ose me ambalazhin bosh.

Karenca:

Nuk aplikohet

Magazinimi:

Ruhet ne vende te thata e te sigurta, i mbyllur hermetikisht ne ambalazhin original.

1 Litër