

Ndikimi ne ekosistem: SP1. Mos ndotni ujin dhe burimet ujore me produktin ose ambalazhin e tij. **H411.** Toksik për jetën ujore me efekte afatgjata. Hidhe ambalazhin bosh, (enën) në kontenjerin per deponimin e mbeturinave të miratuarra.

Karenca: Ne agrume 21 dite; domate dhe pjeper 3 dite; rrush dhe peme frutore 35 dite.

Magazinimi: Ruajeni në ambalazhin original, në vende të thata, të ajrosura e te pa ekspozuara nga drita direkte e diellit.

MASAT PARAMBROJTESE:

- **P102.** Mbajeni ne vende te sigura dhe te pa arriteshme nga femjet.
- Mbajeni larg ushqimeve te njerezve dhe kafsheve, ujtit te pijshem.
- Gjate punes mos hani dhe mos pini lengje e duhan.
- Gjate punes vishni rrobat e punes, paisjet mbrojtese per syte dhe fytyren (doreza, syzet, mbrojesen e ftyres, etj).
- Mbasi punes dhe perpara ngrenies lani duart dhe pjeset e ekspozuara te lekures me uje te bollshem dhe sapun.
- **EUH401.** Zbatoni udhezimet per perdomrin per te shmangur rreziqet ndaj shendetit njerezor dhe mijedistit.
- Mbasi mbarimit te punes lani paisjet mbrojtese, mjetet e sperkatjes dhe asjesoni ambalazhet sipas ligjeve ne fuqi.
- **P501.** Mblidhni ambalazhet ne kontenjere dhe beni shkatterrim e tyre sipas rregullave ne fuqi

FRAZAT E RREZIKUT DHE KESHILLA PER MJEKUN:

- Mund të shkaktoje një reaksiuni alergjik sepse përmban 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Ne rast kontakti me lekuren, lajeni me uje te bollshem dhe me sapun.
- Ne rast kontakti me syte, lani menjehere me uje te bollshem dhe konsultojuni me mjekun.
- Ne rast gelltiti, kerkoni menjehere ndihme mjekesore.
- Permban substancë sensibilizuese dhe shkakton reaksiione alergjike prandaj ne raste te tillë tregojini mjekut etiketen e produktit.
- Nuk ka antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.


Data e prodhimit: Printuar në ambalazh
Afati i ruajtjes: 3 vjet

1 Litër



Lënda vepruese: 500 g/lit Clofentezine
Formulimi: Koncentrat i suspendueshem (SC)
Nr. i regjistrimit: 657, date 6.02.2017

AKARICID ME VEPRIM TE ZGJATUR, SHUME EFIGAS KUNDER VEZEVE DHE FORMAVE TE PORSA SHFAQURA TE KEPUSHAVE (MERIMANGAVE), NE DRUFRUTORE, AGRUME, VRESHTA, PERIME, PJEPEPER DHE LULESHTRYDHE.



MELDI Sh.p.k
Distributori:
MELDI Sh.p.k.
Tiranë - Shqipëri

Aplikant: **ADAMA** Agriculture BV
Prodhuesi: **ADAMA** Makhteshim Ltd,
Israel

APOLLO 50 eshte një akaricid qe vepron nepermjet kontaktit mbi vezet dimerore te tetranikideve (kepushave, merimangave). Gjithashu shume aktiv kunder fazave te hershme te zhvillimit te ketre demtuesve (larvat dhe protonymphs) dhe siguron nje kontroll shume afatgjate gjate gjithe sezonit, ne mase te madhe duke lehtesuar luften kunder kepushave: *Panonychus ulmi*, *Panonychus Citri*, *Tetranychus urticae* dhe *Eotetranychus carpini*. Ne rast te pranise te njekohshme te fazave te ndryshme te zhvillimit te marimangave (veze, larve dhe adulte) eshte e nevojshme qe te kombinohen perdomri me nje akaricid adulticid.

Ne molle, dardhe, pjeske e kumbull: Ne vezet dimerore te *Panonychus ulmi*. Doza e perdomrit: 40 ml/hl, duke nderhyre 10-15 dite para çeljes (jo me shume se sythet C3D ne molle). Shtimi i vajit te bardhe lejon reduktimin e sasisë ne 30 ml/hl. Ne prani te formave te levizshme (merimanga e kuqe) nderhyri, me 30 ml/hl + nje akaricid adulticid te miratuar, pas-lulezimit ose ne shfaqjen e pare te infektimit (1-3 merimanga per gjethje). Trajtimet e mesiperme duhet te konsiderohen alternative. Ne rast te nje infektimi veror (psh ne zona veçanerisht te infektuara ose me pamjaftuesheri grabitqaresh) nderhyri me nje produkt te targetuar per aksion te mire per format e levizshme. Produkti, edhe ne sasi me te medha se ato te treguarat, nuk shfa probleme ne mbulimin e Golden Delicious dhe ne dardhe.

Hardhi: Nderhyri me 20-25 ml/hl (+nje akaricid me veprim adulticid), ne pranine e formes se levizshme *P. ulmi*, ne filzat e rinj (gjatesia 5-30 cm). Ne infektimet me te vona (merimanga e kuqe dhe e verdhe) ndiqni trajtimin me shpejtjesi dhe me pranine e pak merimangave per gjethje. Kunder *E. carpini* rekomandohet perdomri i nje doze pak me te madhe (25-30 ml/hl). Nje aplikim i vetem per sezon eshte përgjithesish i mjaftueshem per te siguruar kontrollin e demtuesve.

Agrume (Portokalli, Mandarina, Klementine, Limoni, Qitro, etj.): Nderhyri ne fazat fillsetare te zhvillimit te infeksionit, me pak merimanga/gjethje. Per kontrollin e *Panonychus citri* perdomri 30 ml/hl + nje akaricid adulticid. Ne pranine e *Tetranychus urticae* keshillohet te rritet sasia ne 40 ml/hl, gjithmonë ne perzierje me nje produkt me veprim adulticid.

Perime te fushes dhe ne serra, domate, kastravec,bostanore, kungullore, luleshtrydhe dhe bime zburuese: Per kontrollin e *T. urticae* nderhyri fillimi me lulezim ose fillim infeksioni ne baze te sistemit te monitorimit me 40 ml/hl + nje akaricid adulticid te miratuar per kete kulture. Nderhyria e hershme me 50 ml/hl vetem per parandalimin e shfaqjes se demtuesve edhe ne periudhene me kritike te maturimit.

Lajthi: Per kontrollin e *P. ulmi*, *T. urticae*, *E. carpini* dhe *P. avellanae*, nderhyri ne rast infektimi me 30-40 ml/hl, pa kaluar masen maksimale 0,4 lit/ha.

Verejtje per perdomrin: Holloni produktin me gjysmen e sasisë totale te ujti te paster per te sperkatur, pastaj shton si asasine e mbetur te ujti. Perzieni produktin per perdomrin si edhe pas nnderprerjeve te shkrurta. Mos e lini perzierjen ne rezervuarin e pompes sperkatese per nje kohe te gjate gjate nates. Lajeni me kujdes pajisjen menjehere pas perdomrit. Siguron i nje gjate te plete dhe uniforme te bimeve. Kyeni aplikimin ne kushtet e eres se paket dhe me pompa qe operojne me shpejtjesi te ulet. Eviton trajtimin ne kushtet e temperaturave te larta dhe lageshit te paket relative. Produkti mund te perzihet me vaj te bardhe, oksiklorur bakri. Nuk keshillohen perzierjet me produkte alkalinë te forta (perzierje me bordolez, polisulfat i kalciumit dhe bariumit, etj.). Sidogofte, nje perdomri i meparshem i polisulfatit nuk nderhyri ne efikasitetin e APOLLO 50 ne vezet dimerore te *Panonychus ulmi*.

Kujdes: Respektoni rigorozisht normat e perdomrit per te neutralizuar shtamet rezistente. Norma maximale e perdomrit: 0.4 lit/ha.