

MASAT PARAMBROJTESE:

- **P201.** Merni udhezime te vecanta para perdorimit.
- **P102.** Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa arriteshme nga femijet.
- **P-280** Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- **P302.** Evitoni kontaktet e zgjatura te lekures me preparatin.
- **P302+P352.** Ne rast kontakti me lekuren lahuni me uje te bollshem dhe sapun
- **P270.** Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkatjes.
- Ne perfundim te punes lani paisjet mbrojtese, mjetet sperkatese.
- Pas perfundimit te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit.
- **P501.** Mblidhni ambalazhet ne kontejnere dhe beni shkaterrimin e tyre sipas rregullave ne fuqi.
- **EUH 401.** Për te shmangur risqet ndaj shëndetit njerëzor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet për përdorimin

FRAZAT E RREZIKUT DHE KESHILLA PER MJEKUN:

- **H317.** Ne kontakt me lekuren mund te shkaktoje reaksion alergjik.
- **H361.** Ka dyshime se demton fertilitetin apo femijen e palindur.
- Ne rast thithje te tretesires sperkatese me organet e frymemarjes, i aksidentuari çohet ne nje mjedis te ngrohete dhe te ajrosur
- Ne rast helmimi, kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore, duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
- Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Dt. Prodhimit: stampuar ne ambalazh
Periudha e ruajtjes: 3 vjet

10 x 1 KG

Aviator

ADAMA

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

Lenda vepruese: **Dimethomorph 9 % +Mancozeb 60%**
Formulimi: **Granula të dispergueshme në ujë (WG).**

Nr i regjistrimit: **489**, datë **02.10.2012**

Fungicid me veprim lokal-sistemik dhe kontakti, me veprim mbrojtës dhe antiporulant, që përdoret me efektivitet të lartë në kontrollin e vrugut në hardhi, patate, domate, trangull e perime të tjera.



Distributor:
MELDI Sh.p.k.
Tirane - Shqiperi



Aplikant: **ADAMA Agriculture BV**
Prodhuesi: **ADAMA Makhteshim Ltd,**
Israel

PERDORIMI:

AVIATOR, ne saje te permbajtjes te Dimetomorphit dhe Mankozebit, eshte nje kombinim teper efektiv, me veprim lokal-sistemik dhe kontakti, per kontrollin e vrugut, njeres prej semundjeve me te njohura ne mjaft prej kulturave bujqesore si hardhi, patate, domate, trangull, bostan, etj. Karakterizohet nga nje mekanizem veprimi specifik duke mos shkaktuar fenomene te krosrezistences me fungicidet sistemike te grupeve te tjera.

Ne domate, trangull, ne sera apo fushe, bostan dhe patate e perime te tjera:

Doza e perdorimit, 200 gr preparat/100 lit uje.

Trajtimet fillojne me renien e shirave te pare ose me shfaqjen e shenjave te para te semundjes. Trajtimet perseriten cdo 10-14 dite. Nese kushtet e motit favorizojne zhvillimin intensiv te semundjeve (vrugut) trajtimet kryhen cdo 7-10 dite Ne domate kryhen deri 5 trajtime ne sezon ndersa ne patate lejohen deri 4 trajtime.

Ne vreshta: Perdoret:

- ne infeksionet e hereshme te gjetheve,
- ne vazhdim te vegjetacionit,
- ne infeksionet e voneshme te gjethes, si dhe
- ne infeksionet ne veshul.

Duke trajtuar heret kur lastari ka aritur 10 cm dhe, kur brenda nje dite kane rene te pakten 10 mm reshje (por jo me vone se dy tre dite pas renies se shirave infektuese), produkti ne saje te depertimit me shpejtesi ne indet gjethore e mbron bimen nga infeksionet e para, duke dhene efektin maksimal.

AVIATOR ndikon ne fuqizimin e lastareve dhe mases vegjetative ne saje te permbajtjes se zinkut dhe manganit sidomos ne ato vreshta qe kane mangesi ne mikroplehra. Doza e perdorimit 200-220 gr/100 lit uje.

Verejtje per perdorimin: AVIATOR mund te perzihet me fungicidet dhe insekticidet e tjera, me perjashtim te atyre me reaksion alkaline Fitotoksiciteti: Nuk eshte fitotoksik kur perdoret me dozat dhe ne kulturat e rekomanduara.

Ndikimi ne ekosistem: H410. I rrezikshem per mjedisin ujor. Toksik per jeten ujore me efekte te gjata.

Karenca: 20 dite per te gjitha kulturat ku rekomandohet.

Magazinimi: Ruhet ne vende te erreta, te fresketa dhe ne ambalazh