

MASAT PARAMBROJTJESË:

- **P102.** Mbajeni në vende të sigurta dhe të pa arritshme nga fëmijet.
- **P201.** Merni udhëzime të vecanta para përdorimit.
- **P270.** Gjate përdorimit të tij mos hani e mos pini ujë dhe duhan.
- **P280.** Gjate punës përdor pajisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- **P501.** Mblidhni ambalazhet në kontejnere dhe beni shkatërrimin e tyre sipas rregullave në fuqi.
- **SP1 A.** Mos ndotni ujin me produktin ose ambalazhin e tij.

FRAZAT E RREZIKUT DHE KESHILLA PËR MJEKUN:

- **H302.** I demshëm nëse gëlltitet. Toksicitet akut (oral).
- **H361D.** I dyshuar për dëmtimin e fetusit (fëmija e palindur)
- **P410.** Toksik për jetën ujore me efekte të gjata e të qëndrueshme.
- **EUH208** Përmban 1,2-Benzisothiazolin-3-one : mund të shkaktojë reaksion alergjik.
- Në rast kontakti me lekuren, pjesët e atakuara lahen menjëherë me ujë të bollshëm e sapun.
- Në rast të kontaktit me sytë : shperlajini ato me ujë të bollshëm dhe sapun për disa minuta dhe pastaj konsultohuni me një okulist
- Në rast helmimi nga goja drejtoheni mjekut dhe i tregoni atij etiketën.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simbas simptomave.

Data e prodhimit: Printuar në ambalazh
Afati i ruajtjes: 3 vjet

1 Litër



PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE

Lënda vepruese: 120 gr/lit Azoxistrobin +200 gr/lit Tebuconazole

Formulimi: SC (suspension i koncentruar)

Nr. i regjistrimit: 652, datë 15/12/2016

FUNGICID SISTEMIK ME VEPRIM PARAMBROJTJES, KURUES DHE CRENJOSË PËR LUFTIMIN E SEMUNDJEVE KERPUDHORE NË PERIME, VRESHTA E DRITHRA



Distributor:
MELDI Sh.p.k.
Tiranë - Shqipëri



Aplikant: ADAMA Agriculture BV
Prodhuesi: ADAMA Makhteshim Ltd,
Israel

PËRDORIMI: CUSTODIA është një fungicid me veprim sistemik parambrojtës, kurues dhe c' renjoses me levizje translaminare. Në saj të përbërjes së dy molekuleve që i përkasin klasave të ndryshme të strubilurinave dhe triazoleve CUSTODIA shfaq një veprim të fuqishëm si parandalues (Azoxistrobina) dhe kurues e c' renjoses (Tebuconazole). Bashkimi i dy molekuleve rit veprimin anti-myk në të gjitha kulturat bujqësore. Krahas luftimit të hirit dhe fusariozave në të lashta ka veprim shumë të mirë në parandalimin e infeksioneve nga vrugu.

NE VRESHTA: kundër hirit (*Uncinula necator*) përdoret 0.75 lit/ha duke trajtuar në intervale 10-14 dite me norme sperkatje 500-1000 lit/ha. Ka efekt dytesor kundër vrugut të hardhise dhe botritit.

NE DRITHRA: kundër hirit (*Erysiphe graminis*) dhe ndryshkut (*Puccinia* spp.). kundër fuzariozës së kallirit (*Fusarium* spp.) trajtimi kryhet në fazën e lulëzimit të plotë; kundër septoriozës (*Septoria* spp.) trajtimi kryhet në fazën e ngritje-kallezimit. Doza e përdorimit 1-1.25 lit/hektar.

NE PERIME: (domate, spec, pjepër, shalqi, trangull, kungull, patllixhan, qepe, hudher, sallate) kundër hirit (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Leveillula taurica*) ndryshkut (*Puccinia* spp., *Alternaria Solani* me konstatimin e shenjave të para trajtohet çdo 10-14 dite duke përdorur 0.5-1 lit/ha me norme uji 500-1000 lit/ha. Efekt mjaft të mirë si parandalues kundër vrugut (*Phytophthora*) Në kushtet e presionit të lartë të infeksionit të semundjes përdoret doza më e lartë e rekomanduar

Verejtje për përdorimin: Custodia përzihet të gjitha fungicidet të insekticidet që kanë reaksion neutral.

Lejohen 2 trajtime në sezon për të lashtat, hardhine, hudhër dhe qepen. Në perime e tjera si domate, patllixhan, kastravec, spec, kungullore e bostanore (në fushë e sere) përdoren deri 3 trajtime në një sezon.

Ndikimi në ekosistem: EUH401. Për të shmangur risqet ndaj shëndetit njerezor dhe mjedisit, zbatoni udhëzimet e përdorimit. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe ruget e ujit me produktin ose ambalazhin bosh. Në rastet e aplikimeve në terrene të hapura për të mbrojtur organizmat ujore duhet të trajtohet në distancë 5-10 m nga basenet ujore apo burimet e ujit, evitoni shpërfaqjen e paisjeve afër ujërave sipërfaqësore, kanaleve të kullimit dhe rrugeve.

Fitotoksiciteti: Në kulturat dhe dozat e rekomanduara nuk ka shfaqur shenja të fitotoksiciteti

Karenca: Domate, kastravec, spec, kungull, patllixhan 3 dite; pjepër e bostan 7 dite; hudher, qepe e hardhi 21 dite; të lashta, grurë i bute e i forte, tritikale dhe elb 35 dite.

Magazinimi: Ruhet në vende të thata dhe në temperatura 0 -35° C.