

Ndikimi në ekosistem:

Nuk është i dëmshëm për insektet e dobishme dhe bletën. H400: Shumë toksik për organizmat ujore. SP1: Mos ndotni ujin dhe burrimet ujore me produktin ose ambalazhin e tij. Mos aplikoni spërktje pranë ujërave sipërfaqës së ujore. Shmangni kontaminimin përmes sistemit të kulimit të ujit në ferma dhe rrugë. Për të mbrojtur organizmat ujore respektoni një brez të sigurisë që nuk trajtohet: 20 m gjelbërim në aplikimet në pemtore dhe perime; 10 m për aplikimet në patate dhe rrush. Për mbrojtjen e artropodëve jo-target, respektoni një rrrip siguri të patrajtuar në zonat e pakultivuara: 30 m për agrume, kajsi, nectarinë; 15 m për pjeshkën, kajsinë, qershinë; 10 m për vreshtin dhe kumbullën; 5 m për perimet, specin, patëllxhanin dhe domaten.

Karenca:

Trajtimi fundit para vjetjes: 3 ditë në qershi, domate e patëllxhan në sera; 7 ditë për hardhinë dhe perimet në fushë të hapur (marule, radhiqe dhe sallata të tjera, patate, specia, domate, patëllxhan); 14 ditë për lule lakrën, brokolini, lakerën, kokë, kajsinë, nektarinë, kumbullën; 28 ditë për pjeshkën; 30 ditë për agrumet dhe frutat e tjera; 60 ditë për greipfrutin, portokallin dhe mollën.

Magazinimi:

Ruhet në ambjente të mbyllura dhe në temperaturë 0 deri 40° C.

Masat parambrojtëse: • P102: Mbajeni në vende të sigurta dhe të pa arritëshme nga fëmijët. • Eviton kontaktet me sytë dhe lëkurën. • P270-Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe duhan. • Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze. • Pas përfundimit të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit. • Lani paisjet mbrojtëse në përfundim të punës. • EUH401: Për të shmagur reziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet e përdorimit. • P501: Mblidhni ambalazhet në kontenierë të veçantë dhe bëni shkatërrimin e tyre sipas regulave në fugu.

Udhëzim për ndihmën e parë dëshironi këshilla përmjet: • H302: I dëmshëm nëse gëllitet. Në rast gjelltësi ose marje me organet e frysëmarrjes: i aksidentuar vendoset në një vend me ajër të pastër dhe të freskët dhe mbulohet përmes ujës. Në rast kontakti me lëkurën apo sytë: lani menjëherë me ujë të pastër dhe sapun pjesët e kontaminuara. • I aksidentuarit nuk jep shenja karakteristike. • Më pas i aksidentuarit dërgohet në një qendër spitallore, ku tregohet etiketa e produktit. • Nuk ka antidot specifik. Aplikohet terapi simptomatike.

Data e prodhimit:

printuar ne ambalazh

1 Lit.

KESTREL

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE

"Lexo fletudhëzuesin para përdorimit"

Lënda vepruese: *Acetamiprid 200 gr/lit.*

Formulimi: *Lëng i tretshëm (SL)*

Nr. i regjistrimit: *705,dt.08/05/2019*



Insekticid sistemik me aktivitet të lartë citotropik-translaminar, që lejon mbrojtjen e organeve vegjetative të reja të zhvilluara pas trajtimit. Efektiv në kontrollin e disa insekteve me aparat gojor shpues-thithes (afidet, aleuroidet, çikadat, tripset) dhe aparat gojor brerës (lepidopterët dhe koleopterët).



Distributori:
MELDI Sh.p.k.
Tiranë - Shqipëri



Aplikant: ADAMA Agriculture BV.
Prodhuesi: ADAMA Makhteshim Ltd

Përdorimi:

Në pemët frutore farore (mollë e dardhë): për kontrollin e afideve, psillave, me 25-30 ml/100 lit ujë; minueseve, morrit të përgjakshëm, me 25-30 ml/100 lit ujë; krimbit të mollës, me 35-50 ml/100 lit uje. Lejohen dy trajtime/sezon me intervalë 8 ditë. Trajtimi i parë rekondohet në fazën e veshëve të miut.

Në bërthamore (kajsi, pjeshkë, nektarinë): kundër afideve, çikalinave, tripsit, lepidopterëve, me 25-50 ml/100 lit ujë. Lejohen deri në dy trajtime/sezon me interval 20 ditë.

Në qershi: kundër afideve dhe mizës së qershisë, me 20-35 ml/100 lit ujë. Dy trajtime/sezon me interval 14 ditë.

Në agrume: kundër minatriçeve dhe afideve, me 35-50 ml/100 lit ujë; formave të mitura të breshkëzave, me 50-70 ml/100 lit ujë. Kryhen dy trajtime/vit me interval 30 ditë. Trajtimi i fundit në fillim të ngjyrosjes së frutave.

Në vresht: kundër *Empoasca vitis*, tenjës, me 30-45 ml/100 lit ujë.

Në patate: kundër afideve, bibrrecit të patates, me 20-30 ml/100 lit ujë. Dy trajtime/sezon me interval 7 ditë.

Në perime në serra dhe fushë (domate, kastravec, patëllxhan, spec): kundër afideve, me 0.25 lit/ha; krahë bardhave dhe tripseve, me 0.35-0.5 lit/ha; koleopterëve, me 35-50 ml/100 lit ujë. Aplikohen dy trajtime/sezon me interval 20 ditë.

Në brokoli, lule lakër, laker, marule eskariola, sallatë: kundër afideve, me 0.25-0.35 lit/ha.

Në duhan: kundër afideve, me 30-50 ml/100 lit ujë.

Vërejtje për përdorimin:

Përzihet me të gjithë insekticidet, me përsjashim të atyre me reaksiون alkalini. Mos aplikoni në kohën e lëvizjes (fluturimit) të insekteve plinnuese. Siguronit një lagje të plotë e të njëtrajtëshme të sipërfaqes gjethore. Në rastet e përdorimit të vëllimit të ulët të ujtit atëhere rritet përqendrimi i përzierjes në mënyrë që të ruhet doza e produktit për njësinë e sipërfaqes (ha) sikurse përdoret në trajtimet normale të volumit të spërkatjes.

Papajtueshmëria:

Në rast të përzierjes me formulime të bazuara në substancë të reja aktive, kryeni analiza paraprake të përzierjes përpëra përdorimit në sipërfaqe të të dhëna.

Në rastet e përzierjeve me substancë të tjera, respektoni periudhën e pritshmërisë të produktit me afatin më të gjatë.