

Ndikimi në ekosistem: H400: Shumë toksik për gjallesat ujore. H410: Shumë toksik për gjallesat ujore, duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos e ndotni ujin me produktin ose enën e tij. Mos e pastroni paisjet e punës në afersi të ujërave sipërfaqësore. Shmangni kontaminimin përmes sistemeve të kullimit të ujit nga fermat dhe rrugët.

Për të mbrojtur organizmat ujore respektioni një rrip sigurie prej 20 m të pa trajtuar nga kanalet e ujërave sipërfaqësore. Për të mbrojtur bimët që nuk janë objekt i trajtimit, respektioni një brez mbrojtës prej 5 m nga zona e trajtuar.

Karenca: Nuk aplikohet.

Ruajta dhe magazinimi: Ruhet në vende të thata, të ajrosura, larg rrezeve direkte të diellit, në temperaturë deri 35°C.

Masat parambrojtëse: • P102: Mbajeni në vende të sigura dhe të pa arritëshme nga fëmjët. • Ruajeni në vende të thata dhe të freskëta, larg ushqimeve dhe pijeve për njerëzit si dhe ushqimeve për blegtoret. •

P261: Shmangni thithjen e produktit me frymëmarrje. • P270: Mos hani, mos pini lëngje dhe duhan gjatë përdorimit të këtij produkti. • P280: Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze. •

EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorimin. • P362+P364: Hiqni rrobat e kontaminuara pas përfundimit të punës dhe lajini ato para ripërdorimit. • P501: Asnjësoni përbajtjen/enën në përputhje me regulloret kombëtare në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun: • Përmban Pendimethalin. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik. • Në rast marrje me organet e frymëmarrjes, nxirreni të aksidentuarin në ajër të pastër. • Në rast kontakti me lëkurën: hiqni rrobat e ndotura, lani menjëherë pjesët e kontaminuara me ujë të bollshëm dhe sapun. Kërkoni ndihmë mjekësore nëse iritimti i lëkurës vazhdon. • Në rast kontakti me sytë: shplajini ata me ujë të bollshëm. • Në rast se produkti është gëlltitur, mos shkaktoni të vjella. Shpëlani menjëherë gojën. • Nëse i aksidentuari ka dëmtimë serioze, kërkoni ndihmë mjekësore ne qendrën spitalore më të afërt duke i treguar mjekut etiketën e preparatit. • Nuk ka antidot specifik dhe terapië është simptomatike. P101: Nëse kërkohet këshilla mjekësore, atëherë i tregoni mjekut etiketën e produktit.

Data e prodhimit: printuar ne ambalazh
Data e skadimit:

1 Lit.

PENDIGAN

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE

"Lexo fletudhëzuesin para përdorimit"

Përmban: 330 gr/lit Pendimethalin
(lëndë vepruese e pastër)

Formulimi: Koncentrat i emulsionushëm (EC)

Nr. i regjistrimit: 708,dt.08/05/2019



**HERBICID SELEKTIV, ME VEPRIM SISTEMIK,
I PARA DHE PAS MBIRJES SË HERSHME,
PËR KONTROLLIN E NJË SPEKTRI TË GJËRË
TË BARËRAVE TË KËQIA GJETHE NGUSHTA
DHE SHUMË BARËRAVE GJETHE GJËRA NË
SHUMË KULTURA BUJQËSORE. VEPRON
PËRMES THITHJES PREJ GJETHEVE DHE
RRËNJËVE. VEPRON MBI BARËRAT E KËQIA
MENJËHERË PAS BULËZIMIT OSE DALJES
MBI TOKË.**



 **MELDI** Sh.p.k

Distributor:
MELDI Sh.p.k.
Tirane - Shqipëri



Aplikant: ADAMA Agriculture B.V.
Prodhuesi: ADAMA Agro Itd

Përdorimi:

Përdoret pas mbirjes, për kontrollin e barërave të këqia në shumë kultura bujqësore si:

Perime, qepë: para mbjelljes ose pas trapiantimit në fazën BBCH 10-13 (tre gjithe).

Hudhër: para mbjelljes ose pas trapiantimit (BBCH 10-12).

Laker, lulelakër, laker bruseli, patellxhan, spec, domate: para trapiantimit.

Drithra (grurë, elb): para mbirjes së farës ose pas mbirjes deri në fazën e 3 gjitheve (BBCH 10-13).

Misër: para mbirjes ose pas mbirjes në fazën BBCH 10-13.

Duhan: para trapiantimit.

Patate: para mbirjes.

Pemë frutore farore e bërrhamore, vreshtë, agrume, bimë zbukuruese: trajtohet kur barërat e këqia janë të reja dhe në rritje intensive.

Përdoret me 4-6 lit preparat, në 400 lit tretësirë spërkatëse/ha. Përdoret 1 herë/sezon.

Ka spektër të gjërë veprimi, duke kontrolluar: - **Barëra të këqia gjethen gushta:** Bisht dhelpra (*Alopecurus ssp.*), *Agrostis gigantea*, *Apera spica-venti*, *Iolium* (*Lolium ssp.*), *Echinochloa ssp.*, *Panicum ssp.*, sorgumi (*Sorghum ssp.*), *Poa ssp.* - **Barëra të këqia gjethet gjëra:** *Adonis ssp.*, *Amaranthus ssp.*, *Anagallis arvensis*, *Anthemis ssp.*, *Aphanes arvensis*, *Atriplex ssp.*, *Bifora radians*, *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chepalaria ssp.*, *Chenopodium album*, *Chrysanthemum ssp.*, *Cirsium arvense*, *Emex australis*, *Erophila verna*, *Galeopsis ssp.*, *Galinsoga ciliata*, *Gallium aparine*, *Gallium tricornutum*, *Helianthus annuus*, *Lamium ssp.*, *Malva ssp.*, *Matricaria spp.*, *Medicago ssp.*, *Melilotua ssp.*, *Myosotis arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum ssp.*, *Ranunculus arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Rapistrum rugosum*, *Rumex ssp.*, *Senecio vulgaris*, *Silene gallica*, *Sinapis arvensis*, *Sisymbrium officinale*, *Sonchus ssp.*, *Spergula arvensis*, *Stellaria media*, *Trifolium ssp.*, *Vicia ssp.*, *Viola ssp.*

Vërejtje për përdorimin:

Kërkoni tokë të përgatitur e të niveluar mirë, me lagështi; mbjellje uniforme të farës, në thellësi 3-4 cm. Për kulturat e trapiantuara (perimet, etj.) kryhet trajtim uniform, duke e shoqëruar me vaditje në formë shiu, 7-8 ditë para trapiantimit pas të cilët kryhet një vaditje tjetër e lehtë. Vepron kryesisht nëpërmjet gjitheve. Në kushtet e tokës me lagështi, kontrollon edhe barërat e këqia që janë në mbirje. Efektiviteti më i lartë arrihet kur barërat e këqia trajtohen në fazat e hershme të zhvillimit dhe kur janë në rritje intensive.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat e rekomanuara në të lashta. Kultura pasardhëse mund të mbillet 6 muaj pas trajtimit.

T7485A_01